

## Auró Japonès

Nom botànic:	<b><i>Acer palmatum</i></b>
Nom en català:	Auró
Nom en castellà:	Arce
Nom en èuscarà:	Astigar
Nom en gallec:	Pradairo
Nom en portuguès:	Bordo
Nom en francès:	Érable
Nom en anglès:	Maple
Nom en italià:	Ácero
Nom japonès:	Momiji



**Característiques:** Arbre de fulla caduca, família de les Acereceae, es tracta d'un arbre de creixement ràpid, molt apreciat per les seves petites fulles que presenten a la tardor una bella coloració groga o vermella.

**Situació:** A l'exterior tot l'any evitant el sol directe, especialment a l'estiu durant les hores de màxima calor. Pot suportar una major insolació si la base de les seves arrels es troba humida; el sol directe pot cremar l'extrem de les seves fulles. També deurem protegir-lo del vent.

**Reg:** L'auró té un consum mínim d'aigua encara que constant, la terra pot assecat-se entre dos regs, un excés d'humitat provoca la podridura de les arrels; li agrada una certa humitat ambiental durant l'estiu, que proporcionarem amb polvoritzacions d'aigua a les fulles; vigileu també a l'estiu amb les cremades per aire calent.

**Adob:** Cada 20 ó 30 dies des de la primavera a la tardor, amb un descans durant el període de màxima calor.

**Trasplantament:** Cada dos anys a la primavera quan les gemmes s'endureixen (abans d'obrir-se al març) o bé a la tardor a la caiguda de les fulles.

**Substrat:** 60 % akadama i 40 % grava volcànica. O substrat similar que dreni bé. Un substrat massa alcalí és perjudicial per al desenvolupament de l'auró, és convenient un substrat una mica àcid.

**Podat:** La poda d'estructura es practica a l'hivern després de la caiguda de les fulles; estudeu la seva silueta, talleu les branques que s'entrecruen, que creixen perpendiculars al tronc o que són paral·leles; una bona poda d'estructura afavoreix una millor ramificació a la primavera; han de segellar-se les ferides grans amb màstic; brota molt bé de poda dràstica.

**Pinçat:** Es realitza durant tota la primavera amb els dits, despuntar tallant les gemmes terminals deixant dos nusos; les fulles grans s'eliminen contínuament.

**Defoliat:** El defoliat es practica al juny; la poda de les fulles es realitza durant el període vegetatiu i permet obtenir un arbre dens i de fulles petites. No defolieu l'arbre el mateix any del seu trasplantament.

**Filferrat:** La forma de l'auró ve determinada generalment per la poda; en cas de filferrar es protegirà l'escorça amb ràfia ja que les seves branques són molt fràgils; Tota manera, l'època millor per a filferrar és quan l'arbre es troba en ple període vegetatiu.

**Paràsits i malalties:** Pugó, cotxinilles, aranya vermella, oïdi

**Propagació:** Per llavors al mes de març, abans de sembrar estratificar-les durant tres mesos en sorra humida; per esqueix a final de l'hivern poseu a remull durant dos dies i unteu en hormones, prepareu un substrat que dreni be per evitar l'entollament.

**Varietats:** A. p. deshojo, a. p. shishigashira, a. p. chiyohime, a. p. kashima.

**Altres dades i curiositats:** Es un dels arbres més característic com a bonsai al Japó i també un dels més resistents a totes les tècniques. El terme "palmatum" fa referència a la forma de palma de les seves fulles.

